

DOMANDA	RISPOSTA (A)	RISPOSTA (B)	RISPOSTA (C)	RISPOSTA ESATTA	
L'ISTRICE E' UN ANIMALE CON:	ABITUDINI NOTTURNE	ABITUDINI CREPUSCOLARI	ABITUDINI DIURNE	A	
DI COSA SI CIBA L'ISTRICE?	ERBE	FRUTTA E GRANDI SEMI OLEOSI	RADICI, BULBI E CORTECCE	C	
QUALE' LA DIFFERENZA CROMATICA DELLA PELLICCIA DEL CONIGLIO SELVATICO E DELLA LEPRE?	GRIGIO NELLA LEPRE E MARRONE GIALLASTRO NEL CONIGLIO	MARRONE GIALLASTRO NELLA LEPRE E GRIGIO NEL CONIGLIO	HANNO LA STESSA COLORAZIONE	B	
IL GATTO SELVATICO E' UNA SPECIE PROTETTA?	NO	SI	PARZIALMENTE	B	
DI COSA SI CIBA IL RICCIO?	INSETTI	FRUTTA E GRANDI SEMI OLEOSI	RADICI, BULBI E CORTECCE	A	
QUALE' L'AMBIENTE NATURALE DEL RICCIO?	ZONE UMIDE	BOSCHI CON VEGETAZIONE BASSA VICINO A PRATI E CAMPI COLTIVATI	BOSCHI FOLTI CON FITTA VEGETAZIONE	B	
QUALE' LA DIFFERENZA MORFOLOGICA FRA IL CONIGLIO SELVATICO E LA LEPRE?	IL CONIGLIO HA ZAMPE PIU' LUNGHE CODA PIU' GROSSA E CRANIO PIU' PESANTE	NEL CONIGLIO LE ZAMPE ANTERIORI SONO PIU' GROSSE E LUNGHE IL PELO E' PIU' CHIARO E FOLTO	LA LEPRE HA ORECCHIE E ZAMPE POSTERIORI PIU' LUNGHE E CRANIO PIU' GROSSO	C	
I PIPISTRELLI SONO?	MAMMIFERI	UCCELLI	RODITORI	A	
IL CONIGLIO SELVATICO SI PUÒ ACCOPPIARE CON LA LEPRE?	SI IN PRIMAVERA	SI, DI FREQUENTE	NO, SONO DUE SPECIE DIVERSE	C	
I FALCHI, LE AQUILE, GLI AVVOLTOI SONO SPECIE CACCIABILI?	SONO SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE	SI, SI POSSONO CACCIARE SOLO A CERTE CONDIZIONI	SONO SPECIE PARZIALMENTE PROTETTE	A	
I FALCHI, LE AQUILE, GLI AVVOLTOI:	SONO RAPACI DIURNI	SONO RAPACI NOTTURNI	SONO CREPUSCOLARI	A	
COSA SI INTENDE PER SPECIE AUTOCTONA?	E' UNA SPECIE INDIGENA DI UNA DETERMINATA AREA	E' UNA SPECIE PROVENIENTE DA ALTRE AREE GEOGRAFICHE	E' UNA SPECIE IMMESA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO	A	
COSA SI INTENDE PER SPECIE ALLOCTONA ?	E' UNA SPECIE INDIGENA DI UNA DETERMINATA AREA	E' UNA SPECIE PROVENIENTE DA ALTRE AREE GEOGRAFICHE	E' UNA SPECIE IMMESA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO	B	
LA CATENA ALIMENTARE DI FATTO SI CONFIGURA COME:	L'INSIEME DELLE MOLTEPLICI PREDE E DEI NUMEROSI PREDATORI	LA BIOMASSA VEGETALE DISPONIBILE SU UN DATO TERRITORIO	IL PASSAGGIO DI ENERGIA CHE INTERCORRE TRA I VEGETALI (PRODUTTORI) E I SUCCESSIVI CONSUMATORI DI DIVERSO LIVELLO (ERBIVORI, ONNIVORI, CARNIVORI, DECOMPOSITORI)	C	
NEI LUOGHI DI SVERNAMENTO PER GLI UCCELLI MIGRATORI NEL NOSTRO EMISFERO, LE DIVERSE SPECIE SI RIPRODUCONO?	NO	SÌ, PURCHÈ IL PERIODO SIA SUFFICIENTE PER COMPLETARE LA COVA DELLE UOVA	SÌ, ESCLUSIVAMENTE LE SPECIE APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DEI TURDIDI	A	

COSA SI INTENDE PER SPECIE AVIFAUNISTICA PARZIALMENTE MIGRATRICE?	UNA SPECIE DELLA QUALE ALCUNE POPOLAZIONI VIVONO STANZIALMENTE SU DETERMINATI TERRITORI, MENTRE IL MAGGIOR NUMERO DEI SOGGETTI MIGRA	UNA SPECIE CHE COMPIE IL TRAGITTO DI MIGRAZIONE STAGIONALE ANNI SÌ E ANNI NO	UNA SPECIE CHE COMPIE MIGRAZIONI MOLTO CONTENUTE	A
L'ATTIVITÀ RIPRODUTTIVA DELLE SPECIE SELVATICHE COME È REGOLATA?	IN MODO CHE LA NASCITA DEI PICCOLI O LA SCHIUSA DELLE UOVA COINCIDA CON L'INIZIO DEL PERIODO PIÙ FAVOREVOLE A GARANTIRE LA MAGGIOR SOPRAVVIVENZA DEI NUOVI NATI	IN MODO CHE INTERCORRANO ALMENO SEI MESI TRA LA NASCITA DI SUCCESSIVE GENERAZIONI	DAL PERIODO DI RICETTIVITÀ DELLE SINGOLE FEMMINE	A
COSA SI INTENDE PER SPECIE MONOGAME?	SPECIE FAUNISTICHE CHE ALLEVANO UN SOLO PICCOLO PER OGNI SINGOLA SCHIUSA DELLE UOVA O PER OGNI NASCITA	SPECIE ANIMALI NELLE QUALI MASCHI E LE FEMMINE DANNO ORIGINE A COPPIE STABILI CHE CONVIVONO PER TUTTO IL PERIODO RIPRODUTTIVO	SPECIE FAUNISTICHE CHE SI RIPRODUCONO UNA SOLA VOLTA OGNI ANNO	B
COSA SI INTENDE PER SPECIE POLIGAME?	SPECIE DOVE MASCHI E FEMMINE FORMANO COPPIE STABILI NEL PERIODO DELLA RIPRODUZIONE	SPECIE ANIMALI ESOTICHE PROVENIENTI DA ISOLE DEL PACIFICO	LE SPECIE OVE I MASCHI DOMINANTI SI ACCOPPIANO CON DIVERSE FEMMINE	C
COSA SONO I FRINGILLIDI?	FAMIGLIA DI UCCELLI DELL'ORDINE DEI PASSERIFORMI	FAMIGLIA DI UCCELLI DELL'ORDINE DEGLI GALLIFORMI	FAMIGLIA DI UCCELLI DELL'ORDINE DEI COLUMBIFORMI	A
COME' CONSIDERATA LA VOLPE?	SPECIE SEMPRE PROTETTA	SPECIE NOCIVA, DA ERADICARE	SPECIE CACCIABILE IN PERIODO DETERMINATO	C
NORMALMENTE QUANTE VOLTE PARTORISCE ANNUALMENTE LA LEPRE?	UNA, RARAMENTE DUE	SETTE	TRE, RARAMENTE QUATTRO	C
QUALI CARATTERISTICHE PERMETTONO DI RICONOSCERE UN MASCHIO DI GERMANO REALE POSATO SULL'ACQUA?	COLLO VERDE CON STRISCIA BIANCA	COLLO VERDE CON STRISCIA ROSSA	SOTTOCODA BIANCO IN CONTRASTO CON IL PIUMAGGIO GRIGIO DEL CORPO	A
COME POSSONO ESSERE DISTINTI GLI AIRONI IN VOLO?	LA TESTA VIENE TENUTA INDIETRO	COLLO TESO MA LEGGERMENTE PENDENTE	TESTA, CORPO E COLLO TENUTI ORIZZONTALMENTE	A
LE ANATRE TUFFATRICI QUANDO DEVONO SPICCARE IL VOLO DA UNA SUPERFICIE D'ACQUA:	SI LANCIANO DIRETTAMENTE FUORI D'ACQUA	CORRONO SULLA SUPERFICIE PRIMA DI SPICCARE IL VOLO	PRIMA DI SPICCARE IL VOLO ESCONO DALL'ACQUA	B
DI CHE COSA SI NUTRONO IN PREVALENZA I RAPACI NOTTURNI?	DI PICCOLI UCCELLI	DI TOPI, RATTI E ALTRI PICCOLI MAMMIFERI	DI SELVAGGINA ADULTA	B
IL POLLO SULTANO È UN:	TURNICIDAE	PHASIANIDAE	RALLIDAE	C
QUALE UCCELLO HA UNA STRISCIA NERA CHE DALLA FRONTE PROSEGUE ALLA GOLA?	LA COTURNICE	GIOVANI E LE FEMMINE DELLA STARNA	IL MASCHIO DEL FAGIANO	A

QUALE ANATRA SI DISTINGUE PER IL SOPRACCIGLIO BIANCO?	FISCHIONE	MARZAIOLA	ALZAVOLA	B
COME SI COMPORTA IN SITUAZIONI DI PERICOLO LA COTURNICE?	SI ALZA SUBITO IN VOLO	CORRE VELOCE	SI NASCONDE SUGLI ALBERI	B
LA GALLINELLA D'ACQUA È:	UNO SCOLOPACIDE	UN RALLIDE	UN FASIANIDE	B
COME SONO LE ZAMPE DEI RALLIDI?	DITA MOLTO CORTE	DITA LUNGHE	DITA PALMATE	B
COME SONO LE ZAMPE DEGLI SCOLOPACIDI?	PALMATE	LUNGHE E SOTTILI	LOBATE	B
COME' IL BECCO DEL BECCACCINO?	BECCO LUNGO E DIRITTO	BECCO RICURVO IN GIÙ	BECCO RICURVO IN SU	A
LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL COLOMBACCIO SONO:	LARGA BANDA BIANCA CHE ATTRAVERSA L'ALA E PICCOLA MACCHIA BIANCA AI LATI DEL COLLO	DUE PICCOLE BARRE ALARI NERE	GROPPONE BIANCO,DUE LARGHE BANDE NERE SULLE ALI, BIANCO SOTTO LE ALI	A
QUAL È IL PERIODO RIPRODUTTIVO DELLA LEPRE?	TUTTO L'ANNO TRANNE IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE	TUTTO L'ANNO	DA FEBBRAIO A GIUGNO	A
FINO A CHE ETÀ VIENE MANTENUTO IL MANTELLO STRIATO NEI CINGHIALI?	4 MESI	10 MESI	12 MESI	A
QUALE DI QUESTI UCCELLI È MIGRATORE?	IL FAGIANO	LA COTURNICE	LA QUAGLIA	C
COSA S'INTENDE PER FAUNA STANZIALE?	FAUNA CHE UTILIZZA UN TERRITORIO NATURALE MOLTO LIMITATO	FAUNA CHE NON COMPIE MIGRAZIONI	FAUNA CHE UTILIZZA SOLO UN AMBIENTE MOLTO PARTICOLARE	B
COSA SI INTENDE PER ALBINISMO E MELANISMO DI UN UCCELLO?	LA PREFERENZA NEL MANGIARE FRUTTA,QUALI PER ESEMPIO MELE E ALBICOCHE	LA TENDENZA A VOLARE NEL BOSCO ALL'ALBA O AL TRAMONTO	LA MUTAZIONE CROMATICA DEL PIUMAGGIO CON TENDENZA AL BIANCO O AL NERO	C
COS'E' LA MUTA DEGLI UCCELLI?	IL CAMBIO DELLE PENNE	LA COVA SUL NIDO	IL PASSO AUTUNNALE	A
COSA SONO GLI UNGULATI?	SONO MAMMIFERI CON GRANDE E SOLIDA UNGHIA	SONO UCCELLI CON LE UNGHIE LUNGHE	SONO GLI ANIMALI IMPORTATI	A
LA RONDINE E' UN INSETTIVORO?	SI	NO	DIPENDE DALL'AMBIENTE	A
IL CINGHIALE PUÒ INCROCIARSI CON IL MAIALE DOMESTICO?	SI	NO, MAI	SI,MA PRODUCE IBRIDI NON FECONDI	A
QUALE DI QUESTI UCCELLI NON E' MIGRATORE?	IL TORDO BOTTACCIO	LA RONDINE	LA COTURNICE	C
IN CHE MESE AVVIENE IL RIPASSO DELLA TORTORA?	MARZO - APRILE	SETTEMBRE - OTTOBRE	A FINE NOVEMBRE	A
IN QUALE MESE SOLITAMENTE E' PIU' ABBONDANTE IL PASO DELLA BECCACCIA?	AGOSTO	FINE NOVEMBRE - DICEMBRE	FEBBRAIO	B
IN QUALE PERIODO DELL'ANNO LA CESENA E' DA NOI PIU' ABBONDANTE?	IN ESTATE	IN AUTUNNO	IN PRIMAVERA	B

I PICCOLI DI CINGHIALE SINO A 4-5 MESI SONO CARATTERIZZATI DA:	MANTELLI DI COLORE ROSSO	MANTELLI DI COLORE BRUNO SCURO	MANTELLI DI COLORE GIALLO DORATO CON STRISCE NERE PARALLELE	C
QUALE DI QUESTI CARATTERI PRESENTA UN LUNGO CIUFFO SULLA NUCA?	LA BECCACCIA	LA PAVONCELLA	IL BECCACCINO	B
QUALI DI QUESTI UCCELLI NON E' MIGRATORE?	L'ALZAVOLA	LA RONDINE	LA COTURNICE	C
QUALE DI QUESTI UCCELLI E' UN RAPACE DIURNO?	IL GUFO COMUNE	L'ALLOCCO	IL NIBBIO	C
QUALE DI QUESTI UCCELLI E' INSETTIVORO?	LA COTURNICE	LA RONDINE	LA MARZAIOLA	B
QUALE E' L'AMBIENTE TIPICO DELLA COTURNICE?	AREE BOSCADE	LE ZONE UMIDE	LE AREE APERTE E LE ZONE AD AGRICOLTURA DIFFERENZIATA	C
I CONFRONTI/SCONTI TRA MASCHI PER IL POSSESSO DELLE FEMMINE NELLE SPECIE POLIGAME SONO FUNZIONALI A:	SELEZIONARE I MASCHI PIÙ DOTATI PER LA SUCCESSIVA PROCREAZIONE	DECONGESTIONARE SITUAZIONI DI TENSIONE CHE SI INSTAURANO DURANTE L'ANNO NELL'AMBITO DELLE POPOLAZIONI FAUNISTICHE SELVATICHE	ALLONTANARE GLI ANIMALI PIÙ DEBOLI	A
COSA SI INTENDE PER "PROLE NIDIFUGA" DI ALCUNE SPECIE AVIFAUNISTICHE?	CHE I PICCOLI SONO IN GRADO DI SEGUIRE I GENITORI ED AUTOALIMENTARSI SUBITO DOPO LA SCHIUSA	CHE I PICCOLI SCAPPANO DAL NIDO APPENA POSSONO	CHE I PICCOLI NASCONO CON GLI OCCHI CHIUSI E DEVONO ESSERE ALIMENTATI DAI GENITORI NEL PRIMO PERIODO DI VITA	A
QUAL È L'HABITAT TIPICO DEL CINGHIALE?	AREE BOSCADE CON RICCO SOTTOBOSCO	CAMPI DI GRANOTURCO POSSIBILMENTE ESTESI	BOSCHI DI CONIFERE DI MEDIA E ALTA MONTAGNA	A
QUAL È L'HABITAT TIPICO DELLA LEPRE?	FORESTE DI LATIFOGIE CON RICCO SOTTOBOSCO	AREE COLTIVATE A VIGNETO	AREE CON PRATI STABILI E ADEGUATE ZONE DI RIMESSA FINO AD UNA QUOTA DI C.A. 1.800 METRI SUL LIVELLO DEL MARE	C
QUAL È L'HABITAT TIPICO DEL CONIGLIO SELVATICO?	AMBIENTI DIVERSI PURCHÉ ASCIUTTI CON PRESENZA DI SIEPI ED ARBUSTI CHE POSSONO OFFRIRE RIPARO	TORBIERE DI PIANURA E COLLINA	RIVE SABBIOSE DEI CORSI D'ACQUA	A
QUAL È L'HABITAT TIPICO DELLA BECCACCIA?	ACQUITRINI E PRATI IRRIGUI	BOSCHI MISTI CON RICCO SOTTOBOSCO E ZONE UMIDE	RIVE LACUSTRI O FLUVIALI	B
QUAL È L'HABITAT TIPICO DELLA COTURNICE?	SEMINATIVO PIÙ O MENO CESPUGLIATO INFRAMMEZZATO A PIETRAIE	ZONE UMIDE	BOSCHI DI CONIFERE CON RADURA	A
L'ALIMENTAZIONE DELLA TORTORA È PREVALENTEMENTE:	INSETTIVORA	FRUGIVORA	GRANIVORA	C

LE CORNACCHIE POSSONO UCCIDERE ALTRI ANIMALI PER CIBARSENE?	NO	SÌ, IN CASI DI ESTREMA NECESSITÀ	SÌ, ABITUALMENTE, ANIMALI MEDIO PICCOLI	C
L'ALIMENTAZIONE DEL BECCACCINO È PREVALENTEMENTE COMPOSTA DA:	PICCOLI SEMI	PICCOLI PESCI E GIRINI	ANELLIDI E LARVE DI INSETTI DIVERSI	C
L'ALIMENTAZIONE DELLA BECCACCIA È PREVALENTEMENTE COMPOSTA DA:	VERMI E LARVE DI INSETTI DIVERSI	SEMI E VEGETALI	PICCOLI PESCI E GIRINI	A
L'ALIMENTAZIONE DELLA LEPRE È PREVALENTEMENTE COMPOSTA DA:	ESSENZE ERBACEE	FOGLIE E ALTRE COMPONENTI ARBOREE	TUBERI E MICORRIZE	A
IL CONIGLIO SELVATICO SI NUTRE PREVALENTEMENTE DI:	VEGETALI CHE TROVA IN SUPERFICIE	RADICI E TUBERI	BACCHE E PICCOLI FRUTTI	A
LA VOLPE SI NUTRE PREVALENTEMENTE DI:	FRUTTA E RIFIUTI ORGANICI	ESCLUSIVAMENTE DI MAMMIFERI E UCCELLI DI PICCOLA/MEDIA TAGLIA	GROSSI INSETTI, MAMMIFERI E UCCELLI MEDIO/PICCOLI, FRUTTI DIVERSI E RIFIUTI ALIMENTARI	C
IL CINGHIALE NEL PERIODO INVERNALE SI NUTRE PREVALENTEMENTE DI:	GRANTURCO RESIDUO E BULBI DI FIORI SPONTANEI	TUBERI, ANELLIDI E LARVE	CASTAGNE, GHIANDE E TUBERI	C
L'ALIMENTAZIONE DELLA COTURNICE È PREVALENTEMENTE COMPOSTA DA:	PICCOLI FRUTTI E GEMME APICALI	VEGETALI FRESCHI E SEMI DI GRAMINACEE SPONTANEE E COLTIVATE	INSETTI DIVERSI	B
IN AMBIENTE NATURALE I MASCHI DELLA COTURNICE SONO FACILMENTE DISTINGUIBILI DALLE FEMMINE?	SÌ	SÌ, NEL PERIODO INVERNALE	NO	C
LA COTURNICE È UNA SPECIE:	MONOGAMA IN PRESENZA DI POCHE FEMMINE	MONOGAMA	POLIGAMA	B
NEL CORSO DELL'ANNO LA COTURNICE PORTA A TERMINE:	2 NIDIALE	1 NIDIATA	DA 2 A 3 NIDIALE	B
IL NIDO DEL FAGIANO VIENE PREDISPOSTO:	SU ARBUSTI AD UNA ALTEZZA NON SUPERIORE AL METRO	IN CAVITÀ ROCCIOSE	A TERRA	C
DOPO LA SCHIUSA I PULCINI DELLA COTURNICE SI PRESENTANO:	IMPLUMI E CON GLI OCCHI CHIUSI	FORNITI DI PIUMINO E GIÀ PRONTI AD ABBANDONARE IL NIDO PER LA RICERCA DEL CIBO IN COMPAGNIA DELLA MADRE	FORNITI DI PIUMINO MA PROTETTI NEL NIDO DOVE I GENITORI LI ALIMENTANO PER LE PRIME TRE SETTIMANE	B
IN AMBIENTE NATURALE NELLA SPECIE COLOMBACCIO I MASCHI SONO FACILMENTE DISTINGUIBILI DALLE FEMMINE?	NO	SÌ	SÌ, MA SOLO DOPO IL SECONDO ANNO DI VITA	A
IL COLOMBACCIO È UNA SPECIE:	RIGOROSAMENTE MONOGAMA	POLIGAMA	DIPENDE DALLA CAPACITÀ ATTRATTIVA DEL MASCHIO	A

LE UOVA DI COLOMBACCIO HANNO UN PERIODO DI INCUBAZIONE...	DA 10 A 12 GIORNI	DA 15 A 17 GIORNI	DA 23 A 25 GIORNI	B
DOPO LA SCHIUSA I PULCINI DEL COLOMBACCIO SI PRESENTANO:	IMPLUMI E CON GLI OCCHI CHIUSI	COPERTI DI PIUMINO E PRONTI A LASCIARE IL NIDO PER PROCACCIARSI IL CIBO	COPERTI DA PIUMINO E CON GLI OCCHI APERTI MA DIPENDENTI DAI GENITORI PER L'ALIMENTAZIONE	A
NEL CORSO DELL'ANNO IL COLOMBACCIO PORTA A TERMINE:	2 - 3 NIDIATE	1 NIDIATA	3 - 4 NIDIATE	A
IN AMBIENTE NATURALE NELLA SPECIE CORNACCHIA GRIGIA I MASCHI SONO FACILMENTE DISTINGUIBILI DALLE FEMMINE?	SÌ	NO	SÌ, MA SOLO DOPO IL SECONDO ANNO DI VITA	B
LA CORNACCHIA GRIGIA È UNA SPECIE:	POLIGAMA	MONOGAMA	DIPENDE DALLA CAPACITÀ ATTRATTIVA DEL MASCHIO	B
IN AMBIENTE NATURALE NELLA SPECIE TORDO BOTTACCIO I MASCHI SONO FACILMENTE DISTINGUIBILI DALLE FEMMINE?	SÌ	NO	SÌ, SOLO NEL PRIMO ANNO DI VITA	B
IL TORDO BOTTACCIO È UNA SPECIE:	MONOGAMA	POLIGAMA	DIPENDE DALLA CAPACITÀ ATTRATTIVA DEL MASCHIO	A
NEL CORSO DELL'ANNO IL TORDO BOTTACCIO PORTA A TERMINE:	DA 3 A 4 NIDIATE	DA 2 A 3 NIDIATE	1 NIDIATA	B
IN AMBIENTE NATURALE NELLA SPECIE GERMANO REALE I MASCHI SONO FACILMENTE DISTINGUIBILI DALLE FEMMINE?	SÌ, FORTE DIMORFISMO TRA I DUE SESSI	NO	SÌ, MA SOLO DOPO IL SECONDO ANNO DI VITA	A
IL GERMANO REALE È UNA SPECIE:	POLIGAMA	DIPENDE DALLA CAPACITÀ ATTRATTIVA DEL MASCHIO	MONOGAMA	C
IL NIDO DEL GERMANO REALE VIENE PREDISPOSTO:	SULL'ACQUA VINCOLATO ALLE IDROFITE	A TERRA	NEI CANNETI SU ISOLOTTI FORMATI DALLA VEGETAZIONE IN DECOMPOSIZIONE	B
NEL CORSO DELL'ANNO IL GERMANO REALE PORTA A TERMINE:	DA 2 A 3 NIDIATE	1 NIDIATA	DA 3 A 4 NIDIATE	B
DOPO LA SCHIUSA LA PROLE DEL GERMANO REALE SI PRESENTA:	NIDIFUGA	IMPLUMI E CON GLI OCCHI CHIUSI	COPERTA DA PIUMINO MA ANCORA INCAPACE DI ABBANDONARE IL NIDO	A
IL PERIODO RIPRODUTTIVO DELLA LEPRE COMUNE INTERCORRE DA:	APRILE/GIUGNO	FEBBRAIO/MAGGIO	GENNAIO/SETTEMBRE	C
NEL PERIODO RIPRODUTTIVO LA FEMMINA DELLA LEPRE COMUNE PARTORISCE DI NORMA:	2 VOLTE	4 VOLTE	7 VOLTE	B

I PICCOLI DELLA LEPRE COMUNE VENGONO PARTORITI:	IN BUCHE SCAVATE NEL TERRENO E RICOPERTE DI PELO	IN MODESTI AVVALLAMENTI DEL TERRENO	IN TANE PROFONDE	B
I PICCOLI DI LEPRE COMUNE ALLA NASCITA SONO:	GLABRI E CON OCCHI CHIUSI (PROLE INETTA)	RICOPERTI DI PELO E CON OCCHI APERTI (PROLE PRECOCE)	RICOPERTI DI PELO O MENO, DIPENDE DALLA TEMPERATURA ESTERNA	B
NEL PERIODO RIPRODUTTIVO LA FEMMINA DEL CONIGLIO SELVATICO PARTORISCE DI NORMA:	2 VOLTE	4 VOLTE	7 VOLTE	C
IL NUMERO DI PICCOLI PER SINGOLO PARTO DEL CONIGLIO SELVATICO VARIA:	DA 1 A 3	DA 3 A 5	DA 5 A 7	C
I PICCOLI DEL CONIGLIO VENGONO PARTORITI:	IN BUCHE SCAVATE NEL TERRENO	IN MODESTI AVVALLAMENTI DEL TERRENO	IN TANE PROFONDE RICOPERTE DI PELO	C
I PICCOLI DI CONIGLIO SELVATICO ALLA NASCITA SONO:	GLABRI E CON OCCHI CHIUSI (PROLE INETTA)	RICOPERTI DI PELO E CON OCCHI APERTI (PROLE PRECOCE)	RICOPERTI DI PELO O MENO, DIPENDE DALLA TEMPERATURA ESTERNA	A
IL PERIODO RIPRODUTTIVO DELLA VOLPE INTERCORRE:	DA APRILE A GIUGNO	DA FEBBRAIO A LUGLIO	DAL 1° AL 30 MAGGIO	A
OGNI ANNO LA FEMMINA DELLA VOLPE PARTORISCE DI NORMA:	1 CUCCIOLATA	2 CUCCIOLATE	3 CUCCIOLATE	A
IL NUMERO DI PICCOLI PER SINGOLO PARTO DELLA VOLPE VARIA:	DA 1 A 2	DA 3 A 5	DA 6 A 8	B
I PICCOLI DELLA VOLPE VENGONO PARTORITI:	IN PICCOLI AVVALLAMENTI DEL TERRENO	IN GIACIGLI DI FOGLIE	IN TANE PROFONDE	C
I PICCOLI DI VOLPE ALLA NASCITA SONO:	GLABRI E CON OCCHI CHIUSI (PROLE INETTA)	RICOPERTI DI PELO E CON OCCHI APERTI (PROLE PRECOCE)	RICOPERTI DI PELO O MENO, DIPENDE DALLA TEMPERATURA ESTERNA	A
IN AMBIENTE NATURALE NELLA SPECIE COTURNICE I MASCHI SONO FACILMENTE DISTINGUIBILI DALLE FEMMINE?	NO	SÌ	SÌ, MA SOLO DOPO IL SECONDO ANNO DI VITA	A
IL NIDO DELLA COTURNICE VIENE PREDISPOSTO:	A TERRA, TRA VEGETAZIONE ARBUSTIVA E ROCCE	IN PROFONDITÀ NELLE PIETRAIE	SU ARBUSTI AD ALTEZZA NON SUPERIORE A 50 CM.	A
LA COTURNICE DEPONE UN NUMERO DI UOVA ...	DA 3 A 5	DA 6 A 8	DA 8 A 14	C
DOPO LA SCHIUSA I PULCINI DELLA COTURNICE SI PRESENTANO:	IMPLUMI E CON GLI OCCHI CHIUSI	COPERTI DI PIUMINO E PRONTI A LASCIARE IL NIDO PER PROCACCIARSI IL CIBO	COPERTI DA PIUMINO E CON GLI OCCHI APERTI MA DIPENDENTI DAI GENITORI PER L'ALIMENTAZIONE	B
IL CINGHIALE È UN UNGULATO RUMINANTE?	SÌ, PERCHÉ SI CIBA PREVALENTEMENTE DI FORAGGIO VERDE	SÌ, COME TUTTI GLI UNGULATI	NO, PERCHÉ HA UNA DIETA ONNIVORA	C
IL CINGHIALE PREDALTRI ANIMALI?	RARAMENTE COMPIE PREDAZIONE ATTIVA SEBBENE ALL'OCCORRENZA SI CIBI DI UOVA E CAROGNE	SÌ, ABITUALMENTE ANCHE ANIMALI MEDIO GRANDI	NON CONSUMA CARNE	A

COSA SI INTENDE PER "ANATRE DI SUPERFICIE"?	GLI ANATIDI CHE FREQUENTANO GENERALMENTE ACQUE POCO PROFONDE E SI CIBANO AFFONDANDO IN ACQUA SOLO LA TESTA E PARTE DEL CORPO	GLI ANATIDI CHE VIVONO SULLA SUPERFICIE DELL'ACQUA QUANDO NON SONO IN PASTURA NEI CAMPI DI MAIS	GLI ANATIDI CHE PER INVOLARSI COMPIONO LUNGHE CORSE SULLA SUPERFICIE DELL'ACQUA	A
COSA SI INTENDE PER "ANATRE TUFFATRICI"?	GLI ANATIDI CHE RAGGIUNGONO LA SUPERFICIE DELL'ACQUA IN PICCHIATA IMMERGENDOSI PER CATTURARE PESCI ANCHE AD ALCUNI METRI SOTTO IL PELO DELL'ACQUA	GLI ANATIDI CHE SI TUFFANO ABITUALMENTE NELL'ACQUA DA POSATOI POSTI AD UNA CERTA ALTEZZA SULLE RIVE	LE ANATRE CHE PREDILIGONO SPECCHI D'ACQUA PROFONDI E SI IMMERGONO IN APNEA ANCHE DI PARECCHI METRI PER ALIMENTARSI SUL FONDO	C
IL BARBAGIANNI E' L'UNICO RAPACE NOTTURNO CON AMPIE PARTI DEL PIUMAGGIO BIANCHE	VERO	VERO MA SOLO SE CONSIDERIAMO LE SPECIE PRESENTI IN ITALIA	FALSO	B
I RAPACI SONO TUTTI SEDENTARI	VERO	VERO SOLO PER IL MERIDIONE D'ITALIA	FALSO	C
I RAPACI SVOLGONO UN RUOLO IMPORTANTE NELL'ECOSISTEMA?	PERCHE' SI ALIMENTANO PRINCIPALMENTE DI RODITORI	PERCHE' DETERMINANO UNA SELEZIONE NATURALE	PERCHE' SONO IN FORTE DIMINUZIONE	B
QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE HA UN LUNGO BECCO RICURVO:	SPATOLA	PITTIMA REALE	CHIURLO MAGGIORE	C
COSA SI INTENDE PER ERRATISMO?	LA MIGRAZIONE AUTUNNALE	I PENDOLARISMI	LA FASE GIOVANILE DI DISPERSIONE	C
LA CAPPELLACCIA DA COSA SI DISTINGUE DALL'ALLODOLA:	DAL SOPRACCIGLIO BIANCO E DALLE ZAMPE PIU' LUNGHE	DAL COLORE GENERALE DEL PIUMAGGIO E DALL'ASSENZA DI UNA CRESTA	DAL CANTO, DALLA CRESTA ACCENTUATA E NON FORMA SOLITAMENTE GRUPPI NUMEROSI	C
QUALE DI QUESTE AFFERMAZIONI E' PIU' APPROPRIATA PER IL FALCO PELLEGRINO:	SI NUTRE QUASI ESCLUSIVAMENTE DI UCCELLI	SI NUTRE IN EGUAL MISURA DI UCCELLI E MAMMIFERI TERRESTRI	SI NUTRE QUASI ESCLUSIVAMENTE DI MAMMIFERI TERRESTRI	A
L'AQUILA REALE QUANTI ANNI IMPIEGA PRIMA DI RIVESTIRE IL PIUMAGGIO DA ADULTO?	CIRCA 2	CIRCA 4 O 5	CIRCA 7	B
LA QUAGLIA SOLITAMENTE SOSTA TRA LA VEGETAZIONE ERBACEA FITTA IN:	AMBIENTI MISTI, RADURE INTERVALLATE DA BOSCHI	GOLENE, AMBIENTI RIPARIALI	AMBIENTI APERTI, SPESSO COLTURE ERBACEE	C
LA FOLAGA E':	UN' ANATIDAE	UN COLUMBIDAE	UN RALLIDAE	C
IL PIUMAGGIO DEL LODOLAIO GIOVANE E' CARATTERIZZATO DA:	PETTO FINEMENTE BARRATO, PARTI SUPERIORI BLU SCURE, CALZARI ROSSI	PETTO STRIATO, PARTI SUPERIORI BRUNO SCURE UNIFORMI, MUSTACCHI EVIDENTI	PETTO STRIATO, PARTI SUPERIORI BRUNO SCURE UNIFORMI, MUSTACCHI ASSENTI	B
QUALE E' L'ORDINE CORRETTO, DALL'ANATRA DI TAGLIA MAGGIORE A QUELLA DI TAGLIA INFERIORE:	GERMANO REALE, ALZAVOLA E MESTOLONE	MESTOLONE, GERMANO REALE E ALZAVOLA	GERMANO REALE, MESTOLONE E ALZAVOLA	C

IL BECCACCINO SI TROVA:	IN PIANURE ALLAGATE, STAGNI E CORSI D'ACQUA	NELLE VALLATE CON UNA FITTA COPERTURA BOSCHIVA	NEI BOSCHI DI CADUCIFOGIE	A
QUALE DI QUESTE SPECIE NON E' UN PASSERIFORME:	CORVO IMPERIALE	PASSERA MATTUGIA	PICCHIO ROSSO MAGGIORE	C
IL TORDO BOTTACCIO NIDIFICA IN SICILIA	SI	NO	SOLO IN MONTAGNA, SOPRA I 1.500 M	B
IL FALCO PECCHIAIOLO SVERNA:	IN AFRICA	IN SICILIA	IN EURASIA	A
LA TORTORA SELVATICA E' UN:	MIGRATORE	SEDENTARIO	MIGRATORE PARZIALE	A
QUANTE SPECIE DI STORNO SONO ABITUALMENTE OSSERVABILI IN SICILIA?	UNA	DUE	TRE	B
QUALE TRA LE SEGUENTI ANATRE E' PARTICOLARMENTE PROTETTA E NE E' RIGOROSAMENTE VIETATA LA CACCIA:	MORETTA TABACCATA	FISCHIONE	CODONE	A
IL GHEPPIO E' STRETTAMENTE LEGATO ALL'AMBIENTE:	BOSCHIVO	UMIDO (CORSI D'ACQUA, LAGUNE, PALUDI, ECT.)	NON E' STRETTAMENTE LEGATO AD UNA SOLA TIPOLOGIA DI HABITAT	C
I PASSERIFORMI COME MIGRANO?	A VOLO BATTUTO	SOSPINTI DAI VENTI PREDOMINANTI	VOLTEGGIANO IN CORRISPONDENZA DI CORRENTI ASCENSIONALI	A
IL VOLO DEL MARTIN PESCATORE E':	DRITTO E VELOCE	ONDULATO, INTERVALLA DEI BATTITI ALARI A DEI RIPOSI	IMPREVEDIBILE CON DEI REPENTINI CAMBI DI DIREZIONE	A
LA CESENA E':	UN TURDIDE, MIGRATORE, IN SICILIA PRESENTE SOLO IN INVERNO	UN TURDIDE, MIGRATORE, IN SICILIA PRESENTE SOLO IN ESTATE	UNA CITTA' LOMBARDA	A
LE SPECIE ALLOCTONE SONO:	SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE	SPECIE ESOTICHE, SCAPPATE DA CATTIVITA' O ACCIDENTALMENTE INTRODOTTE	SPECIE INDIGENE, DIFFUSE NELL'AMBIENTE NATURALE	B
QUALE TRA I SEGUENTI RAPACI DIURNI HA UNA COLORAZIONE DEL PIUMAGGIO MARRONE UNIFORME?	NIBBIO REALE, ADULTO	ALBANELLA MINORE, MASCHIO	FALCO DI PALUDE, GIOVANE	C
QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE E' SPICCATAMENTE GREGARIA IN PERIODO INVERNALE?	FOLAGA	GALLINELLA D'ACQUA	POLLO SULTANO	A
COME SI DISTINGUE IN VOLO UN'ALLODOLA DA UNO STRILLOZZO:	LA PRIMA HA UN VOLO PIU' LENTO ED EMETTE FREQUENTI VERSI	LO STRILLOZZO E' MOLTO PIU' GRANDE DELL'ALLODOLA E NON SI POSA MAI A TERRA	SONO PRATICAMENTE INDISTINGUIBILI	A
LA MIGRAZIONE DEGLI UCCELLI AVVIENE DI GIORNO O DI NOTTE?	SOLO DI GIORNO	SOLO DI NOTTE	SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE, DIPENDE DALLA SPECIE	C
LA CANAPIGLIA PRESENTA UNA DIFFERENZA DI PIUMAGGIO TRA MASCHIO E FEMMINA?	SI	NO	SOLO IN PERIODO ESTIVO	A

QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI SULLA GALLINELLA D'ACQUA E' FALSA?	DA ADULTO HA IL BECCO ROSSO CON LA PUNTA GIALLA E LE ZAMPE VERDI	HA UNA STRISCIA BIANCA LUNGO IL FIANCO, SIA DA ADULTO CHE DA GIOVANE	HA IL SOTTOCODA INTERAMENTE BIANCO, SIA DA ADULTO CHE DA GIOVANE	C
IL NOME SCIENTIFICO DI UNA SPECIE, SONO SEMPRE DUE PAROLE, ESSE INDICANO?	CLASSE E SPECIE	GENERE E SPECIE	FAMIGLIA E SPECIE	B
CHE COSE' LA TORDELA?	E' LA FEMMINA GIOVANE DEL TORDO	E' LA FEMMINA STERILE DEL TORDO	E' UNA SPECIE DI TURDIDE	C
LA TORDELA HA UN PIUMAGGIO:	SIMILE AL TORDO BOTTACCIO, MA CON IL SOTTOALA ROSSO	SIMILE AL TORDO BOTTACCIO, MA CON IL SOTTOALA BIANCO	SIMILE ALLO STORNO COMUNE IN ABITO INVERNALE	B
LA TORDELA E' UNA SPECIE CACCIABILE?	SI	NO	SI SOLO A OTTOBRE	B
UN'ANATRA CON LA TESTA ROSSA E IL PETTO NERO, E' UN...	MESTOLONE	GERMANO REALE	MORIGLIONE	C
QUALE TRA LE SEGUENTI SPECIE NON HA LE ZAMPE PALMATE?	GERMANO REALE	GALLINELLA D'ACQUA	SMERGO MINORE	B
QUALI UCCELLI ACQUATICI PRIMA DI SPICCARE IL VOLO EFFETTUANO UNA BREVE CORSA SULL'ACQUA?	GLI ARDEIDI E I LARIDI	ALCUNE SPECIE DI RALLIDI E ANATIDI	I GALLIFORMI	B
CHE ABITUDINI HA IN AUTUNNO E INVERNO SOLITAMENTE L'ALLODOLA:	E' GREGARIA, FORMA GRUPPI MOLTO COSPICUI	E' SOLITARIA	VIVE PREVALENTEMENTE IN COPPIA	A
QUALE SPECIE DI ANATRA HA UN SOPRACCIGLIO VERDE?	GERMANO REALE	ALZAVOLA	MARZAIOLA	B
NEL FALCO PELLEGRINO C'E' DIMORFISMO SESSUALE?	NO	SI, IL MASCHIO E' PIU' GRANDE DELLA FEMMINA	SI, LA FEMMINA E' PIU' GRANDE DEL MASCHIO	C
COSE' IL GRILLAIO?	UN PASSERIFORME	UN FALCONIFORME	UN GRUIFORME	B
COME PUO' ESSERE DEFINITA L'ALLODOLA:	ARBORICOLA	PRATIVA	RUPICOLA	B
IL MERLO NON HA DIMORFISMO SESSUALE	FALSO	VERO	VERO, MA SOLO DA ADULTO	A
LA POIANA SI RICONOSCE FACILMENTE IN NATURA PER...	LA SILHOUETTE CARATTERIZZATA DA ALI LARGHE E PER IL VOLO VELEGGIATO	IL VOLO TERRITORIALE, DETTO VOLO A FESTONI	L'ESCLUSIVA TECNICA DI CACCIA, COSIDDETTA "SPIRITO SANTO"	A
CHE COSE' LA LEPRE ITALICA?	UNA SPECIE DI LEPRE CHE VIVE SOLAMENTE IN NORD ITALIA	E' LA SPECIE DI LEPRE PRESENTE IN SICILIA	E' UNA SPECIE DI LEPRE ESTINTA	B
LA LEPRE ITALICA E' INSERITA FRA LE SPECIE CACCIABILI	SI	NO	SOLAMENTE IN CENTRO ITALIA	A
LA LEPRE ITALICA E' PRESENTE IN SICILIA?	NO PERCHE' SI E' ESTINTA	NO PERCHE' ENDEMICA DELL'ITALIA CENTRO SETTENTRIONALE	SI E' LUNICA SPECIE DI LEPRE PRESENTE IN SICILIA	C
QUAL'E' LA PRINCIPALE DIFFERENZA FRA LA LEPRE EUROPEA E LA LEPRE ITALICA	LA LEPRE ITALICA E' PIU' PICCOLA	LA LEPRE ITALICA E' PIU' GRANDE	NON C'E' NESSUNA DIFFERENZA	A

CHE COSA E' LA MINI LEPRE?	E' LA LEPRE ITALICA QUANDO E' GIOVANE	E' UNA SPECIE DI LEPRE INTRODOTTA DALLA CINA	E' UNA SPECIE DI CONIGLIO APPARTENENTE AL GENERE SILVILAGUS INPORTATO DALL'AMERICA	C
----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---